

ЗАВОД СИКМО

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ



Общество с ограниченной ответственностью «СИКМО»
ИНН 5003088980, КПП 773101001, ОГРН 1105003006217, ОКПО 68156989
Телефон: 8 (495) 477-44-03, e-mail: info@sikmo.ru, www.plexc.ru
Юридический адрес: 121205, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ
СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ,
ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1, ПОМ 334, РАБ М 45
Фактический адрес: Обособленное подразделение ООО «СИКМО»
142712, Московская область, Ленинский городской округ, Горки
Ленинские п, Каширское шоссе, квартал «Пронино», влад. 1, стр. 1.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «СИКМО»

Загузов М.А.
«13» июня 2023 г.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

PLEX МЫЛО ДЛЯ РУК (С АРОМАТАМИ БЕРГАМОТА И ВЕРБЕНЫ, АРБУЗА, ЖАСМИНА)

РАЗРАБОТАНО:

Руководитель отдела исследований
ООО «СИКМО»

Гольдберг А.А.

ООО «СИКМО» (Российская Федерация)
ГОСТ 31696-2012

Москва 2023

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция предназначена для применения при осуществлении гигиенической обработки кожных покровов рук с использованием жидкого мыла PLEX МЫЛО ДЛЯ РУК.

1.2. Инструкция определяет методы применения средства PLEX МЫЛО ДЛЯ РУК, требования техники безопасности, алгоритм санитарной обработки кожных покровов рук.

2. Описание и состав

2.1. Средство PLEX МЫЛО ДЛЯ РУК предназначено для гигиенической обработки кожных покровов рук. Благодаря специальным компонентам в составе не сушит, а увлажняет кожу рук.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.13422/22 от 05.10.2022 Евразийского экономического союза.

2.2. Средство представляет собой жидкость с цветом применяемого красителя и с запахом применяемой отдушки (вербена, арбуз, жасмин), pH концентрата 5,5-6,5 ед., плотность концентрата 1,00-1,05 г/см³, хорошо растворим в воде.

2.3. Состав препарата.

- INCI: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide DEA, Caprylyl/Capryl Glucoside, Glycerin, Lauryl/Myristyl Betaine, Perfume, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone (CMIT) and Methylisothiazolinone (MIT), [+/- CI 14720, CI 42090, CI 19140]
- Состав: вода, лауретсульфат натрия, хлорид натрия, кокамид ДЭА, каприлил/каприлглюкозид, глицерин, лаурил/миристилбетаин, отдушка, ПЭГ-120 метилглюкоза диолеат, лимонная кислота, метилхлоризотиазолинон (CMIT) и метилизотиазолинон (MIT), красители [+/-CI 14720, CI 19140, CI 42090].

2.4. Срок годности препарата – 12 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой упаковке производителя в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C.

2.5. При соблюдении условий хранения средство в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Является негорючей жидкостью, биоразлагаемо.

2.6. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство при нанесении на кожу, введению в желудок и ингаляционному воздействию относится к IV классу (малоопасные соединения). Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены.

3. Применение средства PLEX МЫЛО ДЛЯ РУК

3.1. Гигиеническая обработка рук: Снимите ювелирные украшения. 2-3 мл средства нанести на влажные кисти рук, запястья;

3.2. Обрабатывать ладони, обратную сторону ладоней, между пальцами, ногти, подушечки пальцев, большие пальцы в течение 1 минуты;

3.3. Смыть проточной водой.

3.4. После обработки руки высушить бумажным полотенцем, протирочным материалом или в автоматическом осушителе для рук.

4. Меры предосторожности

- 4.1. При работе с моющим средством необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях.
- 4.2. Храните в недоступных для детей местах и вдали от продуктов питания. Только для наружного применения.
- 4.3. Смыв в канализационную систему средства следует проводить только в разбавленном виде. Не допускать попадания концентрата в окружающую среду.
- 4.4. Запрещается смешивать с другими моющими средствами.

5. Меры первой медицинской помощи

- 5.1. При попадании средства в глаза необходимо их тщательно промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
- 5.2. При попадании средства в желудок – прополоскать рот, выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Не вызывать рвоту. При необходимости обратиться к врачу.
- 5.3. При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удышье, слезотечение) пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дать теплое питье. При необходимости обратиться к врачу.